

Crema Protectora Extracto de Tepozán y Óxido de Zinc

Fórmula dermoprotectora y calmante para uso diario en piel expuesta al sol o a irritación externa

Crema de uso tópico elaborada con extracto fluido de *Buddleja cordata* (Tepozán) al 5% y óxido de zinc al 5%, en una base vegetal humectante, ligera y no comedogénica. Esta combinación ofrece protección, hidratación y alivio para pieles sensibles o expuestas a agresiones ambientales como sol, sudor, polvo o calor.

Es adecuada para pieles irritadas, con tendencia al acné o reactivas, y puede usarse como protector suave de uso diario, incluso debajo del maquillaje o en combinación con fotoprotectores convencionales.

Ingredientes Activos

Ingrediente	Concentración	Función Terapéutica Principal
Extracto fluido de Tepozán (<i>Buddleja cordata</i>)	5%	Antiinflamatorio, antioxidante, fotoprotector natural
Óxido de zinc	5%	Protector solar físico, calmante, cicatrizante

Extracto de Tepozán (*Buddleja cordata*)

Diversos estudios han demostrado que el Tepozán contiene flavonoides, terpenoides y ácido rosmarínico, compuestos con actividad antioxidante y antiinflamatoria. Estos ayudan a reducir el daño oxidativo inducido por radiación UV, calman la piel inflamada y protegen contra irritaciones externas. En la medicina tradicional mexicana, el Tepozán se ha usado en el tratamiento de quemaduras, infecciones cutáneas, acné y heridas superficiales. Actualmente, se investiga su potencial como fotoprotector natural, gracias a su capacidad para inhibir radicales libres generados por el sol.





Óxido de Zinc

Es un mineral ampliamente utilizado en dermatología por su doble acción: protección solar física de amplio espectro (UVA y UVB), y efecto calmante sobre pieles irritadas, sensibles o con lesiones leves. Actúa formando una barrera superficial que refleja la radiación solar sin causar obstrucción de poros, lo que lo hace ideal para pieles con acné, rosácea o dermatitis.

Modo de uso

Aplicar sobre la piel limpia, dos veces al día o según necesidad. Distribuir de forma uniforme y permitir su absorción. En caso de exposición directa al sol, puede reaplicarse cada 4 horas como complemento del protector solar convencional.

Precauciones

Solo para uso externo.

Evitar contacto directo con ojos y mucosas.

Suspender su uso en caso de irritación persistente.

Conservar en lugar fresco y seco.

Referencias:

1. Villaseñor IM, et al. Actividad antioxidante y antiinflamatoria de Buddleja cordata, J Ethnopharmacol. 2002.
2. Lin TK, Zhong L, Santiago JL. Óxido de zinc en dermatología: una visión general, Dermatol Res Pract. 2018.
3. Comisión Europea – CCSC. Opinión sobre el óxido de zinc (forma nano). 2012.
4. Monografías de la OMS sobre plantas medicinales seleccionadas. Vol. 1, 1999.
5. Blumenthal M. La Comisión Alemana Completa E Monografías, ABC, 1998.

